

University of Groningen

**Chronische pyelonefritis; een aantal klinische waarnemingen, met een studie van de diagnostische betekenis van antilichamen tegen colibacteriën bij urineweginfecties.**

Zeppenfeldt, Ewald

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1968

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Zeppenfeldt, E. (1968). *Chronische pyelonefritis; een aantal klinische waarnemingen, met een studie van de diagnostische betekenis van antilichamen tegen colibacteriën bij urineweginfecties*. [S.n.].

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

## STELLINGEN

### I

De afwijkingen van het nierparenchym die optreden na langdurig gebruik van analgetica, zijn secundair aan necrose van de nierpapillen.

### II

De percutane nierbiopsie is een onontbeerlijk hulpmiddel bij de diagnostiek en behandeling van vele diffuse nierziekten.

### III

Als bij een urineweginfectie de titer der serum-antilichamen tegen het O-antigeen van colibacteriën hoog is, is het waarschijnlijk dat deze bacteriën het nierparenchym hebben aangetast.

### IV

De belangrijkste oorzaak van pijn in de linker thoraxhelft bij jonge mannen in het costoclaviculaire compressie-syndroom.

### V

De toediening van epsilon-amino-capronzuur aan een bloedende patiënt in shock kan tot bilaterale nierschorsnecrose leiden.

Brentjens, Academisch Proefschrift, Amsterdam, 1967.  
J.A.M.A. 199:779, 1967.

### VI

De grote niet-universitaire ziekenhuizen dienen een groter deel van de zogenaamde advanced medical care zoals intermitterende dialyse, langdurige beademing en grote cardiovasculaire ingrepen op zich te nemen.

### VII

Bij acidotische toestanden is er geen direct verband tussen de bewustzijnsgraad en de pH van het serum.

N.E.J.M. 277: 605, 1967.

### VIII

Reeds bij de geringste verdenking van slechthorendheid van een baby of kleuter, dient men een zo volledig mogelijk onderzoek te verrichten, ten einde zonodig direct tot revalidatie te kunnen overgaan.



## IX

Het verdient overweging om lijdens aan atrophia nervi optici hereditaria (Leber) het roken te verbieden.

Clin. Sci. 29: 505, 1965.

## X

De nauwkeurige definitie en systematische verwerking van klachten en verschijnselen van patiënten kunnen deze gegevens het objectieve karakter geven, dat voor wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is.

## XI

De symptomen van een depressie zijn niet bij alle sociale klassen gelijk.

Ann. Int. Med. 67: 695, 1967.

## XII

Ook in ziekenhuizen met uitgebreide laboratoriumfaciliteiten dient het mogelijk te zijn dat de arts zelf het urinesediment bekijkt.

Stellingen behorende bij het proefschrift van  
E. Zeppenfeldt, Chronische Pyelonefritis,  
Groningen, april 1968